

LADO A LA PÍLDORA

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

Las píldoras son anticonceptivos hormonales que funcionan de dos maneras:

1/ PÍLDORAS COMBINADAS: irradian dos tipos de hormonas sintéticas que imitan las hormonas femeninas naturales y producen un doble efecto de inhibir la ovulación y espesar el moco cervical lo que dificulta la movilidad de los espermatozoides.

2/ MINI PÍLDORAS: irradian un tipo de hormona sintética que imita a la progesterona y produce un doble efecto de inhibir la ovulación (la mayoría de los ciclos) y espesar el moco cervical lo que dificulta la movilidad de los espermatozoides.

EFFECTIVIDAD

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,3 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

7 embarazos en 100 casos.



SE DIVIDEN

POR SUS COMBINACIONES: combinadas y mini píldoras.

POR GENERACIONES: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, según las progesteronas sintéticas.

POR LA VARIACIÓN DE LA DOSIS DURANTE EL CICLO: monofásicas, bifásicas, trifásicas, cuadrfásicas y de ciclo continuo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

FRECUENTES (pueden afectar hasta 1 de cada 10 usuarias): Cambios en el estado de ánimo; dolor de cabeza; náuseas; dolor de mamas; problemas con los periodos como periodos irregulares; ausencia de períodos.

POCO FRECUENTES (pueden afectar hasta 1 de cada 100 usuarias): Depresión, nerviosismo, somnolencia; mareo, sensación de hormigueo; migraña, venas varicosas, aumento de la presión arterial; dolor de estómago, vómitos, indigestión, gases intestinales, inflamación del estómago, diarrea; acné, etc.



LADO B LA PÍLDORA

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

HISTORIA

La primera versión de la píldora, fue aprobada en 1960 después de realizarse un estudio en tan sólo 132 mujeres. En 1970, a 10 años de salir al mercado, las píldoras fueron auditadas por el gobierno de USA por la cantidad de efectos secundarios que reportaban las usuarias. De esa lucha, nació el primer prospecto de la historia que tenía como objetivo ser una herramienta para que las mujeres pudieran tomar decisiones informadas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

DESTACABLES

Si bien hay nuevas generaciones de pastillas con menos estrógenos y progestágenos sintéticos, tienen los mismos potenciales efectos secundarios que las de 1.ª generación.

TROMBOSIS O TROMBOEMBOLIAS: las píldoras de 3.ª y 4.ª generación tienen hasta el doble de probabilidades de generar un coágulo que las de segunda.

CÁNCER DE MAMA Y CERVICAL: el Instituto para la Investigación del Cáncer, perteneciente a la OMS, clasificó a los anticonceptivos orales como cancerígenos tipo 1.



CAMBIOS DE HUMOR:

Según relevamiento de Tribu Matriar, un 39,8% sufre alteraciones en el ánimo, un número bastante más elevado que el señalado en el prospecto.

BAJA LIBIDO: un 45% experimentó baja libido según relevamiento de Tribu.



+INFO COMPLETA

JUICIOS

EN USA, Bayer ya tuvo que pagar más de USD 2 billones en juicios por trombosis con las píldoras Yaz y Yazmin a más de 10,000 víctimas; USD 57 millones por juicios por ataques cardíacos e infartos; USD 21,5 millones a aquellas mujeres que sufrieron lesiones vesiculares.

EN FRANCIA, una joven ganó un juicio contra Bayer por una trombosis generada por una píldora de 3.ª generación y recibió € 4.5 millones. En 2020, fue la primera en iniciarle un juicio penal.

MEDIO AMBIENTE

En las últimas décadas, se comprobó científicamente que varios ríos donde se evacúan los desechos cloacales están atestados de etinilestradiol, la principal droga de los anticonceptivos hormonales. Y, peor aún, se encontraron especies de peces feminizadas producto del contacto con estos fármacos.



LADO A PARCHE

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

El parche es un anticonceptivo combinado libera dos hormonas sintéticas (norelgestromina y etinilestradiol) que imitan las naturales.

Estos fármacos cumplen la doble función de inhibir la ovulación y de espesar el moco cervical lo que disminuye las posibilidades de que el espermatozoa acceda al óvulo.

EFFECTIVIDAD

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,3 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

7 embarazos en 100 casos.



EFFECTOS SECUNDARIOS ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

Más del 10% de las usuarias pueden padecer dolor de cabeza; náuseas y sensibilidad en las mamas.

Hasta el 10% de las usuarias pueden sufrir: infección vaginal por hongos; alteraciones del estado de ánimo tales como depresión, cambios de humor, ansiedad, llantos; mareos; migraña; dolor o hinchazón abdominal; vómitos o diarrea; acné; aumento de peso, y muchos más.

BENEFICIO

Las usuarias no deben recordar tomarlo todos los días como la píldora anticonceptiva dado que se adhiere a la piel y se lo cambia una vez por semana, 3 veces al mes.



LADO B PARCHE

ANTICONCEPTIVO HORMONAL


¿CÓMO FUNCIONA?

A diferencia de la píldora que produce un pico de estrógenos cuando se la consume y luego reduce su carga por la metabolización vía el sistema digestivo, el parche satura la sangre de la usuaria por su irradiación constante por más tiempo.

Con los años, se demostró que el parche expone a las usuarias a un 60% más de estrógeno sintético que las que toman las píldoras anticonceptivas.

LOS JUICIOS

En 2008, a seis años de su salida al mercado, más de 3000 mujeres ya habían demandado a Johnson & Johnson, por trombosis, ataques cardíacos, derrames cerebrales, etc. Entre esas demandas, habían 40 muertes adjudicadas al anticonceptivo. Tuvieron que pagar más de USD 69 millones para que los casos no lleguen a juicio y, en 2019, retiró al EVRA del mercado estadounidense.



+INFO COMPLETA

EFFECTOS SECUNDARIOS DESTACABLES

TROMBOSIS, TROMBOEMBOLIAS, E INFARTOS CEREBRO-VASCULARES:

El parche expone al cuerpo a dosis constantes de hormonas sintéticas por lo que hay un aumento enorme de sufrir trombosis: 2 accidentes en personas sin anticonceptivos vs 9.7 si se usa el parche.

INTENTOS DE SUICIDIOS: Ya es bastante conocida y estudiada la relación entre el consumo de productos hormonales y cambios en el ánimo. Pero un estudio danés de 2017 encontró que hay una correlación entre consumo de anticonceptivos e intentos de suicidio. Y, si se utiliza el parche, el riesgo es mucho más elevado que si se utilizan píldoras: 1.91 versus 3.28.

MEDIO AMBIENTE

Además del desecho de hormonas sintéticas vía orina en el medio ambiente, el parche anticonceptivo tiene un adicional de impacto ambiental dado que el remanente desechado aún contiene cantidades considerables de hormonas sintéticas.



LADO A ANILLO

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

El anillo anticonceptivo es un dispositivo circular flexible que lo coloca la usuaria dentro del canal vaginal, como la copita o el tampón. Tanto la versión anual como la mensual del anillo son anticonceptivos combinados. Esto quiere decir que funcionan inhibiendo la ovulación mediante la liberación en el torrente sanguíneo de estrógeno y progestágeno sintéticos.

EFFECTIVIDAD

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,3 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

7 embarazos en 100 casos.

BENEFICIO

La usuaria no debe recordar tomarlo todos los días como la píldora, dado que se cambia 1 vez al mes.



EFFECTOS SECUNDARIOS ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

FRECUENTES (pueden afectar a 1 de cada 10 usuarias): dolor abdominal, náuseas, infecciones vaginales, infecciones urinarias, molestias vaginales debidas al anillo, picor genital, flujo vaginal, dolor de cabeza o migraña, dolor en las mamas, menstruación dolorosa, sangrado irregular.

En el prospecto de la versión mensual, suman 3 efectos frecuentes, no menos importantes: cambios de humor, baja libido, acné y muchos más.



LADO B ANILLO

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

EFFECTOS SECUNDARIOS

DESTACABLES

INTENTO DE SUICIDIO: El impacto en el ánimo puede ser tan grande que se encontró una correlación entre quienes usan este anticonceptivo y los intentos de suicidio. El riesgo es mucho más elevado que si se utilizan píldoras: 1.91 versus 2.58 más de probabilidad.

ANILLO Y TROMBOSIS: Otra variable que es importante conocer es que este anticonceptivo de 3.ª generación promocionado como de baja dosis hormonal, tiene más probabilidades de generar trombosis que las versiones anteriores de 2.ª generación. Y esto fue comprobado por dos estudios muy importantes.

MEDIO AMBIENTE

El anillo tiene un adicional de impacto ambiental aún mayor que el parche. Además de la contaminación via orina, el anillo descartado tiene una carga de 2,4mg de etinilestradiol, 33% más que 3 parches y 6 veces más que un ciclo entero de píldoras anticonceptivas.



+INFO COMPLETA

JUICIOS

3800 mujeres le hicieron juicio a Merck por casos de trombosis derivados del uso del NuvaRing. 83 de estos casos fueron fatales y muchos de ellos eran jóvenes menores de 35 años que no fumaban, contrariamente a lo que advierten en la página web de estos anticonceptivos.

En 2014, Merck ganó gracias al NuvaRing USD 723 millones. Con esas ganancias pagó USD 100 millones para costear las demandas y se quedó con USD 623 millones en el bolsillo. Todo esto a costa de la salud y la vida de miles de mujeres.

La versión anual no tiene este historial pero no es porque no tenga efectos secundarios sino porque hace poco tiempo que está en el mercado.

LADO A INYECCIONES

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

HAY DOS VERSIONES: una de aplicación mensual, que contiene una combinación de estrógenos y progestágenos sintéticos y, otra de aplicación trimestral, que contiene sólo progestágenos sintéticos.

En ambos casos, los fármacos actúan inhibiendo la ovulación y alterando el ambiente cervical y uterino, reduciendo también la movilidad de los espermias y las chances de implantación del óvulo.

EFFECTIVIDAD

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,2 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

4 embarazos en 100 casos.



EFFECTOS SECUNDARIOS ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

MUY FRECUENTES (pueden producirse en al menos 1 de cada 10 usuarias):
Desarreglos de la menstruación, dolor de cabeza, mareo, malestar, cansancio, dolor abdominal, cambios de peso, nerviosismo.

FRECUENTES (pueden producirse en al menos 1 de cada 100 usuarias): moles-
tias en la vagina, aparición de flujo
blanquecino procedente de la vagina,
dolor en las mamas, disminución del
deseo sexual, depresión, insomnio,
sofocos, náuseas, erupción en la piel,
caída del pelo y falta de crecimiento
del pelo, acné, dolor de espalda,
calambres en las piernas, dolor en la
pelvis, edema, hinchazón.

BENEFICIO

La usuaria no debe recordar tomarla
diariamente como la píldora anticon-
ceptiva, dado que se
aplica cada 1 o 3 meses.



LADO B INYECCIONES

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

LA DEPO

Y LA PÉRDIDA DE DENSIDAD ÓSEA

Actualmente, este fármaco posee una
alerta en etiquetado negro en su pros-
pecto. Esta medida es la alerta máxima
que pone la FDA cuando un producto
está relacionado con serios problemas
de salud. En 2004, numerosos estudios
científicos asociaron su uso con una pér-
dida significativa de densidad ósea que
no redime con la discontinuación del
método y que vuelve el cuerpo más pro-
penso a fracturas y al desarrollo de osteo-
porosis. Por este motivo, la Depo tiene
cientos de juicios en USA y Canadá dan-
do vueltas. Así, hace casi 20 años que en
su prospecto recomiendan el uso de este
anticonceptivo sólo si otras formas de
anticoncepción no resultaron adecuadas.

TECNOLOGÍA

A CARGO DEL PROVEEDOR

Las inyecciones pertenecen a la familia
de anticonceptivos cuyo control está en
manos de los profesionales de la salud.
Pero en este caso es aún peor porque
no se puede remover si hay efectos
secundarios y no queda otra alternativa
que esperar a que se pasen.



+INFO COMPLETA

LA DEPO

Y EL CÁNCER DE MAMA

La relación entre el uso de este fármaco
y el cáncer de mama estaba amplia-
mente documentado desde sus oríge-
nes. Aún así, la FDA decidió aprobarlo.
Pero la evidencia científica cada vez fue
más sólida. En 2012, un importante
estudio del Centro de Investigación del
Cáncer (USA) encontró que el uso de la
inyección aumentaba 2.2 veces el ries-
go de desarrollar cáncer de mama.

LA CEREZA DEL POSTRE

El fármaco que contiene la Depo es
EL MISMO que se emplea para castrar
químicamente a los pederastas en USA.
En el hombre, produce una reducción
de la testosterona afectando su deseo
sexual. En la mujer, además de lo
expuesto, puede disminuir la libido,
generar depresión y se tarda más en
volver a la fertilidad una vez que se
termina el tratamiento.

LADO A DIU DE COBRE

ANTICONCEPTIVO NO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

El DIU es un pequeño dispositivo plástico que tiene forma de T cuya varilla y brazos están recubiertos de un filamento de cobre que ejerce el efecto anticonceptivo liberando sus iones en nuestros úteros.

Su mecanismo de acción se cree que es el siguiente: por un lado, el cobre tendría un efecto espermicida y, por otro, se piensa que el mineral tiene un impacto en el pH del revestimiento endometrial que impide que el óvulo, si fue fertilizado, se implante en el útero. Usamos el condicional porque no se sabe a ciencia cierta cómo funciona.

EFFECTIVIDAD


SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,6 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

0,8 embarazos en 100 casos.



EFFECTOS SECUNDARIOS ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

GRAVES: Embarazo ectópico y riesgos de embarazo intrauterino; infección con riesgo de muerte; enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o endometritis; incrustación; perforación de la pared uterina; expulsión; cambios en el sangrado.

COMUNES: Anemia; dolor durante las relaciones sexuales; períodos prolongados; irritación vaginal; dolor de espalda; expulsión (completa o parcial); sangrado intermenstrual; períodos con dolor; secreción vaginal; calambres.

BENEFICIO

La usuaria no debe recordar tomarlo diariamente como la píldora, dado que se lo coloca una vez y dura 5 años.



LADO B DIU DE COBRE

ANTICONCEPTIVO NO HORMONAL

HISTORIA

Existió un diu de cobre antes de los actuales llamado escudo Dalkon que fue prohibido porque generó 18 muertes y miles de infecciones en USA. El escándalo del Dalkon generó un cambio importante en la FDA: empezaron a requerir más estudios para los dispositivos médicos que, hasta ese momento, no tenían tantos controles como los fármacos.

EFFECTOS SECUNDARIOS DESTACABLES

El cobre es un mineral que está presente en todos los cuerpos humanos. En cantidades normales, es un elemento clave para la salud. Sin embargo, cuando se está expuesto a fuentes externas (cañerías, las amalgamas dentales o un DIU de cobre) aumenta significativamente el riesgo de sufrir una intoxicación por exceso de cobre. Los síntomas del exceso de cobre incluyen: acné; alergias; anemia; anorexia; artritis; dolores articulares; depresión; ansiedad; neuralgia; insomnio; hipertensión; síndrome de cansancio crónico; caída de cabello; migrañas; neblina mental.



+INFO COMPLETA

TECNOLOGÍA A CARGO DEL PROVEEDOR

El DIU pertenece a la familia de anticonceptivos cuyo control está en manos de los profesionales de la salud. Esto significa que la usuaria tiene poco control sobre su uso: tanto la inserción como la extracción dependen de otra persona. Esto no es menor y debemos tenerlo en cuenta cuando estamos buscando qué opción anticonceptiva es mejor para nosotras porque muchas veces encontramos mucha facilidad para ponernos los dispositivos y muchas barreras para quitárnoslo.

DOLOR

EN LA INSERCIÓN Y EN LA REMOCIÓN

Por lo general, nadie informa que ponerse o sacarse el diu puede doler bastante. Entonces no se ofrece analgesia. En el 2021, una usuaria del dispositivo de Reino Unido, Lucy Cohen, sacó el problema a la luz con una encuesta que lanzó sobre sus redes sociales: el 93% de las usuarias sintieron dolor durante la inserción y un 23% lo encontraron INSOPORTABLE.

LADO A

DIU HORMONAL

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

Es un dispositivo en forma de T que irradia de manera constante en el útero levonorgestrel (Lng), un tipo de progesterona sintética, y es insertado dentro de la cavidad uterina por un profesional de la salud. El levonorgestrel hace más espeso el moco cervical e inhibe la motilidad y función de los espermatozoides dentro del útero y las trompas de Falopio, lo cual previene la fertilización. Además, inhibe la ovulación en algunos ciclos.

IMPORTANTE: Al igual que su versión no hormonal, no se sabe a ciencia cierta cómo funciona el dispositivo.

EFFECTIVIDAD

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,5 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

0,7 embarazos en 100 casos.



EFFECTOS SECUNDARIOS

ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

MUY FRECUENTES (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): Sangrado uterino o vaginal; incluyendo manchado; períodos infrecuentes y ausencia de sangrado; quistes ováricos benignos.

FRECUENTES (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): Humor depresivo o depresión; nerviosismo; disminución de la libido; dolor de cabeza; dolor abdominal; náuseas; acné; dolor de espalda; dolor pélvico; dismenorrea; flujo vaginal; vulvovaginitis; tensión en las mamas; dolor de mama; expulsión del anticonceptivo intrauterino; aumento de peso.

BENEFICIO

La usuaria no debe recordar tomarlo diariamente como la píldora, dado que se lo coloca una vez y dura 5 años.



LADO B

DIU HORMONAL

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

EFFECTOS SECUNDARIOS

DESTACABLES

CÁNCER DE MAMA: Cada vez hay más estudios que relacionan el uso de DIUs hormonales con el aumento de probabilidades de cáncer de mama. En el 2023, la Universidad de Oxford encontró que usar el diu hormonal aumenta entre el 20 y 30% la posibilidad de desarrollar cáncer de mama.

CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO: Esto no sólo está incluido en la lista de potenciales efectos secundarios enumerados en su prospecto sino que además cuenta con el respaldo de varias investigaciones.

DOLOR

EN LA INSERCIÓN Y EN LA REMOCIÓN

Por lo general, nadie informa que ponerse o sacarse el diu puede doler bastante. Entonces no se ofrece analgesia. En el 2021, una usuaria del dispositivo de Reino Unido, Lucy Cohen, sacó el problema a la luz con una encuesta que lanzó sobre sus redes sociales: el 93% de las usuarias sintieron dolor durante la inserción y un 23% lo encontraron INSOPORTABLE.



+INFO COMPLETA

TECNOLOGÍA

A CARGO DEL PROVEEDOR

El DIU pertenece a la familia de anticonceptivos cuyo control está en manos de los profesionales de la salud. Esto significa que la usuaria tiene poco control sobre su uso: tanto la inserción como la extracción dependen de otra persona. Esto no es menor y debemos tenerlo en cuenta cuando estamos buscando qué opción anticonceptiva es mejor para nosotras porque muchas veces encontramos mucha facilidad para ponernos los dispositivos y muchas barreras para quitárnoslo.

JUICIOS

La FDA recibió más de 110,000 reportes por efectos adversos del Mirena hasta el momento. Muchas de estas denuncias iniciaron juicios por los siguientes efectos secundarios: perforaciones en el útero; hipertensión idiopática intracraneal (cuadro que es similar a un tumor cerebral); cáncer de mama. Hasta ahora Bayer pagó USD 12.2 millones en USA para arreglar demandas de perforaciones de útero.



LADO A IMPLANTE

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

¿CÓMO FUNCIONA?

El implante anticonceptivo es una varilla de plástico que es insertada quirúrgicamente por un profesional de la salud. Esta varilla libera una hormona sintética que imita a la progesterona natural.

HAY DOS VERSIONES: Una con etonogestrel y otra con levonorgestrel. Estos químicos inhiben la ovulación y espesan el moco cervical dificultando el paso de los espermatozoides.

DURACIÓN: Se pueden usar entre 3 a 5 años dependiendo el modelo.

EFFECTIVIDAD SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

EN SU USO PERFECTO:

0,1 embarazos en 100 casos.

EN SU USO REAL:

0,1 embarazos en 100 casos.



EFFECTOS SECUNDARIOS

ENUMERADOS EN EL PROSPECTO

MÁS FRECUENTE: Cambio en su patrón normal de sangrado menstrual. En estudios, 1 de cada 10 mujeres dejó de usar el implante por un cambio desfavorable en su patrón de sangrado. Se puede experimentar un sangrado más prolongado o más breve durante sus períodos, o no tener ningún sangrado. El tiempo entre períodos puede variar, y también puede experimentar manchado entre los períodos.

FRECUENTES: Cambios de estado de ánimo; aumento de peso; dolor de cabeza; acné; estado de ánimo depresivo; inflamación de la vagina; dolor en las mamas; infecciones virales; dolor de estómago; menstruaciones dolorosas; nerviosismo; dolor de espalda; náuseas, mareos; dolor en el lugar de inserción.

BENEFICIO

La usuaria no debe recordar tomarlo diariamente como la píldora, dado que se lo coloca una vez y dura 3 años.



LADO B IMPLANTE

ANTICONCEPTIVO HORMONAL

MIGRACIÓN DEL IMPLANTE

Parece que sucede más a menudo de lo publicitado que los implantes migren al pulmón, pecho o arterias vitales. Por lo tanto, si se opta por este método anticonceptivo es importante saber si la versión que se van a colocar es radiopaca. Esto quiere decir que puede ser vista con resonancias o radiografías porque hay versiones viejas como el Implanon que no lo son.

JUICIOS

Como su predecesor llamado Norplant que fue sacado del mercado por tener varios juicios en su contra, al Implanon le llegó su turno porque en muchos casos migraba y no lo podían encontrar. Después de muchos juicios, sacaron una versión radiopaca (visible con rayos X) llamada Nexplanon. Sin embargo, esta nueva versión ya tiene demandas en su contra por diseño defectuoso y por no alertar del aumento del riesgo de trombosis, infartos y accidentes cerebro vasculares.



TECNOLOGÍA

A CARGO DEL PROVEEDOR

El implante pertenece a la familia de anticonceptivos cuyo control está en manos de los profesionales de la salud. Esto significa que la usuaria tiene poco control sobre su uso: tanto la inserción como la extracción dependen de otra persona. Esto no es menor y debemos tenerlo en cuenta cuando estamos buscando qué opción anticonceptiva es mejor para nosotras porque muchas veces encontramos mucha facilidad para ponernos los dispositivos y muchas barreras para quitárnoslos.

NO HA SIDO ESTUDIADO EN POBLACIONES ADOLESCENTES

Los implantes anticonceptivos han sido estudiados en poblaciones entre 18 y 40 años de edad.

Sin embargo, hay más países que lo utilizan en políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente. Deberían informar que no ha sido estudiado su impacto en este tipo de población.



+INFO COMPLETA