



Fertilidad integrativa



Mat. Paula Mella



“ESCUELA
CICLICA”



Fertilidad integrativa



Mat. Paula Mella



“ESCUELA
CICLICA”

Paula Mella Concha

Matrona

Especialista en Salud Menstrual

Educadora Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad

.....

MATRONA, U DE LA FRONTERA.

MATRONA CLÍNICA EN DSM TEODORO SCHMIDT DESDE 2017
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MENSTRUAL, ESCUELA LA TRIBU

EDUCADORA EN FERTILIDAD NATURAL, ESCUELA EFER

DIPLOMADA EN GINECOLOGÍA PARA APS. U DE ATACAMA

DIPLOMADA EN SALUD PÉLVICA, MAULEDUC

DIPLOMADO EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA. U DE LA
FRONTERA

DICPLOMADO EN MEDICINA REPRODUCTIVA E INFERTILIDAD (C)

AUTORA DE "EL PLACER DE CONOCERNOS" Y "EL LADO INVISIBLE DE
SER MUJER"



Resultado de aprendizaje

Integrar la mirada de la fertilidad femenina y masculina en el contexto actual, incluyendo infertilidad, reproducción asistida y el rol del método sintotérmico en la búsqueda de embarazo.



INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DE LA FERTILIDAD

PANORAMA ACTUAL DE LA FERTILIDAD

- Cambios en los patrones reproductivos
- Factores sociales, económicos y culturales
- **Postergación de la maternidad**



PANORAMA ACTUAL DE LA FERTILIDAD

- Trastornos metabólicos
- Obesidad
- Síndrome de ovario poliquístico
- Alteraciones del ciclo menstrual




Exposición a **factores ambientales**, como disruptores endocrinos, que pueden interferir con la regulación hormonal y afectar la función reproductiva.


FACTORES QUE AFECTAN LA FERTILIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL



*La fertilidad humana es el resultado de la interacción entre múltiples factores. En el contexto actual, estos factores pueden agruparse en tres grandes dimensiones: **biológicos**, **ambientales** y **de estilo de vida**.*



FACTORES QUE AFECTAN LA FERTILIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL



FERTILIDAD COMO FENÓMENO DE PAREJA

Se estima que:

- Aproximadamente un tercio de los casos se debe a factores femeninos
- Un tercio a factores masculinos
- Un tercio a causas mixtas o no identificadas

IMPORTANCIA DE UNA MIRADA INTEGRATIVA EN FERTILIDAD

- La fertilidad no puede entenderse **únicamente desde una perspectiva biomédica** centrada en **órganos o sistemas aislados**.
- Es el resultado de la **interacción entre múltiples sistemas** fisiológicos, incluyendo el sistema endocrino, metabólico, inmunológico y nervioso.
- Adoptar una mirada integrativa implica reconocer que la salud reproductiva no depende únicamente de la función ovárica o espermática, sino también del equilibrio global del organismo.




✧ ✧

FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA

✧ ✧ ✧


FISIOLOGÍA FEMENINA: OVOGÉNESIS Y DESARROLLO FOLICULAR



FSH


LH

Ciclo ovárico



OVOGÉNESIS


- Etapa fetal → Células germinales se diferencian en ovogonias (mitosis). 6–7 millones de ovogonias.
- Las ovogonias → entran en meiosis → se convierten en ovocitos primarios → se detiene la meiosis I
- La reanudación y completación de meiosis I ocurre justo antes de la ovulación, inducida por el pico de LH. → Ovocito secundario (aquí ocurre la primera división cromosómica (reducción de 46 a 23 cromosomas))
- El ovocito secundario → inicia meiosis II, pero queda detenido → Ovula
- La meiosis II solo se completa si el espermatozoide penetra el ovocito.



DESARROLLO FOLICULAR

Independiente de FSH-LH.
Maduración +/- 200 días

Dependiente de FSH-LH. +/- 14 días



F. Primordial
Folículo inmaduro, ovocito al centro rodeado de células foliculares

F. Primario
Celulas foliculares van madurando y formando las células de la granulosa

F. Secundario
Aparecen receptores de FSH

F. Terciario (antral)
Se forman celulas de la teca, celulas de granulosa responden a FSH

Reanuda meiosis I

Ovocito primario

Ovocito primario

Concluye meiosis I

Ovocito Secundario


Inicio meiosis II (detenido)

Ovocito Secundario

Ovocito fecundado = Óvulo y reanudación meiosis II

AMH EN EL DESARROLLO FOLICULAR

- Secretada por células de la granulosa de folículos preantrales y antrales pequeños.
- inhibir el reclutamiento excesivo de folículos primordiales (reclutamiento inicial), para proteger reserva ovárica
- Refleja el tamaño del grupo de folículos en desarrollo, **no de los primordiales.**
- Suprime el desarrollo folicular dependiente de FSH → Disminuye la sensibilidad a FSH » evita un reclutamiento excesivo de folículos antrales (reclutamiento cíclico), asegurando que solo uno dominante ovule



ESPERMATOGÉNESIS

La espermatogénesis es el proceso mediante el cual se producen los espermatozoides en los túbulos seminíferos de los testículos. A diferencia de la ovogénesis, este proceso es continuo desde la pubertad.

Este proceso dura aproximadamente 64–74 días y requiere una regulación hormonal adecuada.

- GnRH » estimula hipófisis
- LH » estimula células de Leydig » producción de testosterona
- FSH » actúa sobre células de Sertoli » soporte de la espermatogénesis
-

La testosterona es esencial para la maduración espermática.

ESPERMATOGÉNESIS

Espermatogonias (fase mitótica)

- Células madre germinales diploides (46 cromosomas)

Espermátocitos (fase meiótica)


- Los espermátocitos primarios inician meiosis I → Ocorre recombinación genética y reducción cromosómica (46 → 23)

Espermátidas

- No hay división celular, sino diferenciación estructural


Espermatozoides maduros

- Liberados al lumen y maduran en el epidídimo




FECUNDACIÓN

1




Penetración en
la corona radiada

2




Penetración en
la zona pelúcida

3




Fusión de
las membranas

4




Fusión de
los núcleos


DESARROLLO EMBRIONARIO TEMPRANO E IMPLANTACIÓN



Fecundación






Cigoto




Estadio de 2 células



Estadio de 4 células




Estadio de 8 células




Mórula

Día 4




Blastocisto

Día 5-6: blastocisto



IMPLANTACIÓN




Eclosión


Aposición

Adhesión

Invasión




Embrión implantado



Para que ocurra un embarazo se requiere la coordinación precisa de múltiples eventos:

- Ovulación de un ovocito competente
- Producción de espermatozoides funcionales
- Encuentro de ambos gametos
- Fecundación
- Desarrollo embrionario
- Implantación exitosa

Este proceso es altamente eficiente, pero también vulnerable a múltiples factores, lo que explica por qué la fertilidad puede verse afectada por distintos elementos.





1 BPD 5.01 cm 21w1d 24-04-2017
2 HC 19.13 cm 21w3d 22-04-2017
3 AC 15.93 cm 21w0d 25-04-2017
4 FL 3.53 cm 21w1d 24-04-2017
EFW1 401 g 21w2d 23-04-2017

CLINIC

MI
Tis

VENTANA FÉRTIL Y PROBABILIDAD DE EMBARAZO


Pen1
Harmonic
Gr 52
D 134
M 7
FA 5
P 06

5.01 cm 21w1d 24-04-2017
21w3d 22-04-2017
25-04-2017

CONCEPTO DE VENTANA FÉRTIL

La ventana fértil corresponde al período del ciclo menstrual durante el cual existe una probabilidad real de lograr un embarazo:

- La **sobrevida** de los **espermatozoides** en el tracto reproductivo femenino
- La **viabilidad** del ovocito tras la ovulación



SOBREVIDA DE LOS GAMETOS

Sobrevida espermática

Los espermatozoides pueden sobrevivir en el tracto reproductivo femenino hasta 3 a 7 días, pero esta capacidad depende de las condiciones del entorno cervical y uterino.

El moco cervical estrogénico:

- Facilita el transporte espermático
- Protege a los espermatozoides del ambiente vaginal
- Permite su almacenamiento en criptas cervicales

En ausencia de moco cervical fértil, la sobrevida espermática se reduce considerablemente.

SOBREVIDA DE LOS GAMETOS

Sobrevida ovocitaria

El ovocito, una vez ovulado, tiene una vida media mucho más corta, aproximadamente **12 a 24 horas**.

Si no ocurre fecundación dentro de este período, el ovocito pierde su capacidad de ser fecundado.



PROBABILIDAD DE EMBARAZO SEGÚN EL MOMENTO DEL CICLO

Estudios han mostrado que:

- La mayor probabilidad de embarazo ocurre en los **2 días previos a la ovulación**
- El día de la ovulación también es fértil, pero con menor probabilidad que los días previos
- Después de la ovulación, la probabilidad de embarazo cae rápidamente

VARIABILIDAD DE LA OVULACIÓN


- Frecuencia del ciclo
- Estrés
- Alimentación
- Enfermedad
- Cambios en el estilo de vida
- Edad reproductiva
- Simplemente porque somos diferentes

Por esta razón, el uso de métodos basados únicamente en el calendario puede ser impreciso.



ERRORES FRECUENTES E IMPLICANCIA CLÍNICA

- Creer que la ovulación ocurre siempre el mismo día
- Pensar que el embarazo solo es posible el día de la ovulación
- Asumir que ciclos regulares garantizan ovulación
- No considerar el rol del moco cervical



A person is holding a medical model of a uterus and an ultrasound image. The model is a cross-section of a uterus, showing the internal structure, including the endometrium and the fallopian tubes. The ultrasound image is a black and white scan of a uterus, showing the internal structure. The text "EVALUACIÓN DE LA FERTILIDAD" is overlaid on the image in a large, white, serif font. There are four starburst graphics: one at the top left, one at the top right, and two at the bottom right.

EVALUACIÓN DE LA FERTILIDAD

FERTILIDAD COMO EVALUACIÓN DE PAREJA

Históricamente, la evaluación se ha centrado en la mujer, pero la evidencia muestra que:

- ~30% de las causas son femeninas
- ~30% masculinas
- ~30% mixtas
- ~10% inexplicadas

EVALUACIÓN DE LA FERTILIDAD FEMENINA

La evaluación femenina debe orientarse a responder tres preguntas clave:

¿Existe ovulación?

¿Cómo está la reserva ovárica?

¿Existen condiciones que dificulten la fecundación o implantación?

EVALUACIÓN DE LA OVULACIÓN

- Progesterona en fase lútea
- Método sintotérmico
- Ecografía de seguimiento folicular

RESERVA OVÁRICA

- AMH (Hormona antimülleriana)
- Recuento folicular antral (AFC)

RESERVA OVÁRICA

Reserva Ovárica Baja

Entre 0,2 y 1 ng/ml.

Reserva Ovárica Normal

Entre 1 y 3 ng/ml.

Reserva Ovárica Alta

Más de 3 ng/ml.

Entre 30-33 años:

2,4-2,1 ng/ml.

Entre 33 y 35 años:

2,1-1,7 ng/ml

Entre 35 y 40 años:

1,7-1,1 ng/ml.

Mayores de 41 años:

1,1-0,5 ng/ml.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

- Regularidad menstrual
- Dismenorrea severa (sospecha de endometriosis)
- Antecedentes ginecológicos
- infecciones pélvicas
- Cirugías previas
- Insuficiencia lútea
- Mutaciones genéticas

Estos factores pueden afectar la fertilidad más allá de la ovulación.

EVALUACIÓN DE LA FERTILIDAD MASCULINA

Espermograma

Este estudio evalúa las características del semen y los espermatozoides.

PARÁMETROS PRINCIPALES


- Concentración
- Movilidad
- Morfología
- Otros aspectos

Importancia clínica

Alteraciones en cualquiera de estos parámetros pueden afectar la probabilidad de fecundación, incluso si la mujer presenta ciclos normales.

PARÁMETROS PRINCIPALES



- 
-  **Volumen:** ≥ 1.5 ml
 -  **pH:** 7,2 - 8,0
 -  **Recuento:** > 15 millones por ml
 -  **Total de espermatozoides:** > 40 millones
 -  **Movilidad progresiva:** $\geq 32\%$
 -  **Espermatozoides vivos:** $> 58\%$
 -  **Espermatozoides normales:** $\geq 4\%$

¿CUÁNDO INICIAR ESTUDIO DE FERTILIDAD?

Se recomienda iniciar estudio cuando:

- <35 años: 12 meses sin embarazo
- ≥35 años: 6 meses sin embarazo
- ≥40 años: evaluación inmediata

ENFOQUE CLÍNICO ESTRATÉGICO

La evaluación de la fertilidad no debe ser una batería de exámenes indiscriminada, sino un proceso dirigido por la clínica.
Es importante preguntarse:

- ¿Qué quiero evaluar?
- ¿Qué sospecho?
- ¿Qué información necesito confirmar?

ROL DEL CICLO MENSTRUAL EN LA EVALUACIÓN

El ciclo menstrual sigue siendo una herramienta clave.
Permite:

- Evaluar ovulación
- Identificar alteraciones hormonales
- Orientar estudio


El uso del método sintotérmico puede aportar información muy valiosa en este contexto.



FACTORES QUE AFECTAN LA FERTILIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL




FERTILIDAD COMO PROCESO SENSIBLE AL ENTORNO



La fertilidad humana no es un proceso aislado ni automático, sino altamente dependiente del entorno fisiológico del organismo. Para que ocurra la reproducción, el cuerpo necesita interpretar que existen condiciones adecuadas para sostener un embarazo.

EDAD Y FERTILIDAD


- **Disminución de la reserva ovárica**
- **Deterioro de la calidad ovocitaria:** Con la edad aumentan los errores en la meiosis, lo que incrementa el riesgo de:
 - aneuploidías
 - fallas en la fecundación
 - pérdida gestacional



EDAD Y FERTILIDAD


Aunque la fertilidad masculina es más prolongada en el tiempo, también se han descrito cambios asociados a la edad:

- Disminución de la movilidad espermática
- Aumento de fragmentación del ADN
- Alteraciones epigenéticas





METABOLISMO, ALIMENTACIÓN Y FERTILIDAD

- **Insulina y función ovárica**
- **Disponibilidad energética**
- **Calidad de la alimentación**



INFLAMACIÓN, ESTRÉS OXIDATIVO Y FERTILIDAD


- Inflamación sistémica de bajo grado
- Estrés oxidativo
- Rol de la mitocondria



Célula sana



Célula estresada



Inflamación



Daño en el ADN
(genotoxicidad)



Muerte celular
(citotoxicidad)

MICROBIOTA INTESTINAL Y FERTILIDAD

→ Estroboloma

- Exceso o déficit de estrógenos
- Alteraciones del ciclo


→ Inflamación y permeabilidad intestinal

La disbiosis puede generar:

- Aumento de permeabilidad intestinal
- Activación inflamatoria


Esto impacta:

- eje hormonal
- ambiente uterino



ESTRÉS, RITMOS CIRCADIANOS Y FERTILIDAD

- El estrés crónico activa el eje HPA
→ aumento de cortisol →
inhibición de GnRH → alteración
de ovulación
- Alteraciones del sueño → Cambios
en pulsatilidad GnRH →
irregularidad menstrual →
alteración de la fase lútea
- Melatonina y fertilidad: Actúa como
antioxidante, protege el ovocito,
participa en la regulación ovárica



DISRUPTORES ENDOCRINOS

Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que interfieren con la señalización hormonal.

Se encuentran en:

- plásticos (BPA)
- cosméticos
- pesticidas

DISRUPTORES ENDOCRINOS



Pueden:

- Imitar hormonas (efecto agonista)
- Bloquear receptores (efecto antagonista)
- BPA puede unirse a receptores de estrógeno

Esto altera la señalización hormonal normal del eje reproductivo → Estudios han demostrado que exposición a BPA se asocia con: Alteración del desarrollo folicular, Mayor atresia folicular, Disminución de reserva ovárica.


En general, los DE se han asociado con aumento: Estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, irregularidad menstrual, alteraciones ovulatorias, y alteración de receptividad endometrial y expresión de genes relacionados con implantación



La fertilidad en el contexto actual está influida por múltiples factores que van más allá de la anatomía reproductiva.

Hoy sabemos que:

- El metabolismo
- La inflamación
- El estrés



son determinantes clave en la función reproductiva.
Esto abre la puerta a un **abordaje integrativo**, donde el estilo de vida juega un rol central.



INFERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA

INFERTILIDAD



La infertilidad se define clínicamente como la incapacidad de lograr un embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección.

Según guías de OMS, ESHRE y ASRM, esta definición se ajusta según la edad:

- <35 años: estudio tras 12 meses
- ≥ 35 años: estudio tras 6 meses
- ≥ 40 años: evaluación inmediata

EPIDEMIOLOGÍA Y RELEVANCIA CLÍNICA

La infertilidad afecta aproximadamente al 10–15% de las parejas en edad reproductiva a nivel mundial.



PRINCIPALES CAUSAS DE INFERTILIDAD



Las causas de infertilidad se clasifican en cuatro grandes grupos:


Factor ovulatorio

Factor tubario

Factor uterino

Factor masculino

INFERTILIDAD INEXPLICADA



FACTOR OVULATORIO


Corresponde a alteraciones en la ovulación.

Ejemplos:

- síndrome de ovario poliquístico
- amenorrea hipotalámica funcional
- insuficiencia ovárica prematura

Mecanismo:

- alteración del eje HHO
- disfunción en desarrollo folicular
- ausencia de ovulación



FACTOR TUBARIO

Se relaciona con alteraciones en las trompas de Falopio.

Ejemplos:

- enfermedad inflamatoria pélvica
- infecciones previas (Chlamydia)
- cirugías abdominales

Mecanismo:

- obstrucción tubaria
- alteración del transporte de gametos

FACTOR UTERINO

Afecta la implantación.

Ejemplos:

- miomas
- pólipos
- malformaciones uterinas

Mecanismo:

- alteración del endometrio
- interferencia en la implantación

FACTOR MASCULINA

Presente en aproximadamente un tercio de los casos.

Ejemplos:

- oligozoospermia → concentración de espermatozoides inferior a 15 millones por mililitro.
- astenozoospermia → movilidad espermática reducida o nula, impidiendo que los espermatozoides lleguen al óvulo.
- teratozoospermia → Se refiere a que más del 96% de los espermatozoides presentan formas anómalas (cabeza, cuello o cola), según criterios de la OMS

Mecanismo:

- alteración en cantidad, movilidad o morfología
- daño en ADN espermático

INFERTILIDAD INEXPLICADA

Se diagnostica cuando:

- todos los estudios básicos son normales
- pero no se logra embarazo

Esto puede reflejar alteraciones sutiles en:

- calidad ovocitaria
- interacción gamética
- implantación

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA TRA

Las técnicas de reproducción asistida buscan superar barreras específicas en el proceso reproductivo. Se clasifican en:

Baja complejidad

- Coito dirigido (natural / Estimulación ovárica)
- **Inseminación intrauterina (IIU):** Se introduce espermatozoides capacitados en cavidad uterina
 - Ciclo natural (menos frecuente)
 - Estimulación ovárica farmacológica (letrozol, clomifeno o gonadotropinas)
 - Monitoreo: ecografía para seguimiento folicular, medición de tamaño folicular, evitar MULTIPLES FOLÍCULOS OVULATORIOS, Inducción de ovulación (se administra hCG, simula pico de LH), ovulación ocurre ~36 horas después
 - Preparación muestra espermática.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA TRA

Alta complejidad

→ Fecundación in vitro (FIV)

- Estimulación ovárica (letrozol, clomifeno o gonadotropinas))
- Extracción de ovocitos
- Fecundación en laboratorio
- Transferencia embrionaria

→ ICSI (inyección intracitoplasmática)


- Estimulación ovárica → Controlada → Farmacología y protocolos ajustados a reserva ovárica y respuesta individual de paciente.
- Punción ovárica y aspiración folicular: Cuando las ecografías de control muestran folículos con un tamaño adecuado (generalmente >18-20 mm)
- Fecundación en laboratorio (un espermatozoide se inyecta directamente en el ovocito)
- Transferencia embrionaria: En fresco (días después de la punción) o diferida (embriones vitrificados/congelados).




MÉTODO SINTOTÉRMICO Y BÚSQUEDA DE EMBARAZO

¿QUÉ ES EL MÉTODO SINTOTÉRMICO?

BIOMARCADORES DE FERTILIDAD




TIEMPOS DE FERTILIDAD




UN REFLEJO DEL CICLO OVÁRICO

- Moco cervical → Estimulado por E2 → Desarrollo folicular → **Ovulación**
- **Moco cervical** → **Sobrevida espermática**



UN REFLEJO DEL CICLO OVÁRICO

- Temperatura basal → Estimulado por P → Desarrollo de cuerpo lúteo → **Confirma Ovulación**






25 jun 2025 -

Objetivo: Intentar lo que sea (TTW)

Fecha		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Día de la semana		m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l
Día del ciclo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41



Intimidad

Conteo dias


1. 2. 3. 4. 5.

¿Cómo vemos una fase lútea deficiente en un gráfico?

Ciclo N°: ____ Vía temperatura: ____ Hora: ____ Duración del ciclo: ____ Ovulación: Si ___ No ___ N° días de fase lútea: ____
Últimos 12 ciclos: Más largo: ____ Más corto: ____ Día de la 6ta temperatura baja: ____

Matrona 
Paula Mella

Mes																																							
Día																																							
Día del ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Sangrado	🩸	🩸	🩸																					🩸	🩸		🩸	🩸	🩸										
Relaciones sexuales																																							



G
R
O
S
C
E
L
I
U
S

CCNT
LBP

Día	Temperatura (GROS)
1	36,1
2	36,3
3	36,1
4	36,2
5	36,4
6	36,2
7	36,1
8	36,1
9	36,2
10	36,3
11	36,2
12	36,3
13	36,2
14	36,3
15	36,2
16	36,1
17	36,1
18	36,4
19	36,5
20	36,6
21	36,5
22	36,4
23	36,5
24	36,3
25	36,4
26	36,3
27	36,3
28	36,1

LDC = most

Paula Heller

$L > C$
altai-f

LBP
(difere
Buxa
que
LBP
alt

CC
del
Se
de

GRADOS
CEL
CIUS

[illegible]

APLICACIÓN EN BÚSQUEDA DE EMBARAZO

El MST:

- Confirmar ciclos ovulatorios
- Identifica salud del ciclo → Ejemplo, salud de la fase lútea.
- Permite optimizar el momento de las relaciones sexuales.
- Identifica momento óptimo de utilizar test de LH
- Optimizar realización de exámenes según día del ciclo.





Reflexión final: Una mirada integral en la búsqueda de embarazo



CAMBIO DE PARADIGMA: DE INTERVENCIÓN A ACOMPAÑAMIENTO

El abordaje de la fertilidad no debe centrarse únicamente en:


- Exámenes
- Diagnósticos
- Tratamientos



Dinámico
Influenciado por múltiples factores




Acompañar a una mujer o a una pareja en la búsqueda de embarazo implica mucho más que identificar días fértiles o solicitar exámenes. Implica comprender que la fertilidad es la expresión de un sistema complejo, donde interactúan factores biológicos, metabólicos, emocionales y ambientales. Como matronas y educadoras, nuestro rol no es solo intervenir, sino también traducir, orientar y acompañar procesos que muchas veces son inciertos, largos y profundamente significativos para quienes los viven.



Bibliografía

- Agarwal, A., Gupta, S., & Sharma, R. (2012). Role of oxidative stress in female reproduction. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 10, 49. <https://doi.org/10.1186/1477-7827-10-49>
- Baker, F. C., Driver, H. S., & Rogers, G. G. (2017). Circadian rhythms, sleep, and the menstrual cycle. *Sleep Medicine Reviews*, 32, 46–60. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.02.003>
- Barrea, L., Muscogiuri, G., Laudisio, D., et al. (2021). Nutrition, inflammation and reproductive function. *Nutrients*, 13(6), 1942. <https://doi.org/10.3390/nu13061942>
- Diamanti-Kandarakis, E., Bourguignon, J. P., Giudice, L. C., et al. (2009). Endocrine-disrupting chemicals: An Endocrine Society scientific statement. *Endocrine Reviews*, 30(4), 293–342. <https://doi.org/10.1210/er.2009-0002>
- European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). (2019). ESHRE guideline: Ovarian stimulation for IVF/ICSI. *Human Reproduction Open*, 2020(2), hoaa009. <https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa009>
- European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). (2023). ESHRE guideline: Female infertility. <https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Female-infertility>
- Gore, A. C., Chappell, V. A., Fenton, S. E., et al. (2015). EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. *Endocrine Reviews*, 36(6), E1–E150. <https://doi.org/10.1210/er.2015-1010>
- Mihm, M., Gangooly, S., & Muttukrishna, S. (2011). The normal menstrual cycle in women. *Animal Reproduction Science*, 124(3–4), 229–236. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2010.08.030>
- Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2021). Fertility evaluation of infertile women: A committee opinion. *Fertility and Sterility*, 116(5), 1255–1265. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.08.003>
- Skoracka, K., Ratajczak, A. E., Rychter, A. M., et al. (2021). Female fertility and the microbiota. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(20), 11081. <https://doi.org/10.3390/ijms222011081>
- Wilcox, A. J., Weinberg, C. R., & Baird, D. D. (1995). Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. *New England Journal of Medicine*, 333(23), 1517–1521. <https://doi.org/10.1056/NEJM199512073332301>
- World Health Organization. (2021). WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen (6th ed.). Hennegan, J., Winkler, I. T., Bobel, C., Keiser, D., Hampton, J., Larsson, G., Chandra-Mouli, V., Plesons, M., & Mahon, T. (2021). Menstrual health: a definition for policy, practice, and research. *Sexual and reproductive health matters*, 29(1), 1911618. <https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1911618>



Bibliografía

- Mihm M, Gangooly S, Muttukrishna S. The normal menstrual cycle in women. Anim Reprod Sci. 2011 Apr;124(3-4):229-36. doi: 10.1016/j.anireprosci.2010.08.030. Epub 2010 Sep 3. PMID: 20869180.
- Ecochard R, Gougeon A. Side of ovulation and cycle characteristics in normally fertile women. Hum Reprod. 2000 Apr;15(4):752-5. doi: 10.1093/humrep/15.4.752. PMID: 10739814.
- Song, S., Choi, H., Pang, Y. et al. Factors associated with regularity and length of menstrual cycle: Korea Nurses' Health Study. BMC Women's Health 22, 361 (2022)
- Kapper, C., Oppelt, P., Ganhör, C., Gyunesh, A. A., Arbeithuber, B., Stelzl, P., & Rezk-Füreder, M. (2024). Minerals and the Menstrual Cycle: Impacts on Ovulation and Endometrial Health. Nutrients, 16(7), 1008. <https://doi.org/10.3390/nu16071008>
- Reed BG, Carr BR. Endotext. MDTText.com, Inc.: South Dartmouth. South Dartmouth, MA: MDTText.com, Inc.; 2000. El ciclo menstrual normal y el control de la ovulación.
- Geta, T., Woldeamanuel, G., & Dassa, T. (2020). Prevalence and associated factors of premenstrual syndrome among women of the reproductive age group in Ethiopia: Systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.024170>
- Agarwal, A., Gupta, S., & Sharma, R. (2012). Role of oxidative stress in female reproduction. Reproductive Biology and Endocrinology, 10(49). <https://doi.org/10.1186/1477-7827-10-49>
- Barrea, L., Muscogiuri, G., Laudisio, D., et al. (2021). Nutrition, inflammation and reproductive function in women. Nutrients, 13(6), 1942. <https://doi.org/10.3390/nu13061942>
- Baker, F. C., Driver, H. S., & Rogers, G. G. (2017). Circadian rhythms, sleep, and the menstrual cycle. Sleep Medicine Reviews, 32, 46–60. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.02.003>
- Brown, E. D. L., Obeng-Gyasi, B., Hall, J. E., & Shekhar, S. (2023). The thyroid hormone axis and female reproduction. International Journal of Molecular Sciences, 24(4), 3987.
- Clancy, K. B. H., Baerwald, A. R., & Pierson, R. A. (2013). Systemic inflammation is associated with ovarian follicular dynamics during the human menstrual cycle. PLoS ONE, 8(5).
- De Souza, M. J., Williams, N. I., & Nattiv, A. (2014). Misunderstanding the female athlete triad: Refuting the IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S). British Journal of Sports Medicine, 48, 1461–1465



GRACIAS